



MEM,含 Earle's 盐和 L-谷胺酰氨, 不含非必需氨基酸

货号: M3410

规格: 500ml

有效期: 2-8°C避光保存, 有效期 12 个月。

产品简介:

Minimum Essential Medium (MEM) 由Harry Eagle于上个世纪50年代开发的培养基工艺, 是最常用的细胞培养基之一, 早期应用于正常哺乳动物成纤维细胞和特定HeLa细胞亚系的培养。相对于Eagle's Basal Medium (BME), MEM中添加了细胞必需的营养成分, 随后的研究显示这些添加的营养成分对大多快速增殖的细胞有促进作用。MEM含有较高水平的氨基酸, 接近于培养的哺乳动物的组分。MEM广泛用于支持单层细胞的生长, 选择性添加非必需氨基酸和Hank's/Earle's盐更进一步扩大了MEM的使用范围。另外降低培养基中钙离子含量适用于悬浮细胞的培养。

本品含有L-glutamine。

渗透压: 300±20 mOsm

酸碱度: 7.2±0.2

Components	Concentration (mg/L)
<i>Inorganic Salts</i>	
CaCl ₂ (anhydrous)	200.00
KCl	400.00
MgSO ₄ (anhydrous)	97.70
NaCl	6800.00
NaH ₂ PO ₄ • H ₂ O	140.00
Na ₂ HPO ₄	-
NaHCO ₃	2200.00
<i>Amino Acids</i>	
L-Arginine • HCl	126.40
L-Cystine • 2HCl	31.20
L-Glutamine	292.00
L-Histidine • HCl • H ₂ O	41.90
L-Isoleucine	52.50
L-Leucine	52.50
L-Lysine • HCl	72.50
L-Methionine	15.00
L-Phenylalanine	32.50
L-Threonine	47.60
L-Tryptophan	10.00
L-Tyrosine • 2Na • 2H ₂ O	51.90
L-Valine	46.80

<i>Vitamins</i>	
D-Calcium pantothenate	1.00
Choline chloride	1.00
Folic acid	1.00
<i>i</i> -Inositol	2.00
Nicotinamide	1.00
Pyridoxine • HCl	1.00
Riboflavin	0.10
Thiamine • HCl	1.00
<i>Other</i>	
D-Glucose	1000.00
Phenol red, Na	10.00

参考文献:

1. Eagle, H., et al myo-Inositol as an Essential Growth Factor for Normal and Malignant Human Cells in Tissue Culture. J.Biol. Chem., 214, 845-847(1956).
2. Eagle, H., Media for Animal Cell Culture. Tissue Culture Association Manual. 3, 517-520 (1976).
3. Eagle, H., Amino Acid Metabolism in Mammalian Cell Cultures. Science. 130, 432-437(1959).
4. Eagle, H., Nutrition Needs of Mammalian Cells in Culture. Science. 122, 501 (1955).